

Szczepionkę podaje się w trzech dawkach. Po podaniu trzech dawek czasem wykonuje się badanie krwi, by sprawdzić, czy posiadasz ochronę. Do skutków ubocznych należą bolesność i zaczerwienienie w miejscu wkłucia.

- Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz zajście w ciążę, przed szczepieniem należy przekazać tę informację lekarzowi.
- Nie pozwalaj, by dzieci dotykały krwi lub płynów ustrojowych ani jakichkolwiek chusteczek higienicznych zabrudzonych krwią lub płynami ustrojowymi, należących do osób zakażonych WZW B.
- Jeżeli dzieci są narażone na kontakt z krwią osoby zakażonej WZW B i nie otrzymały ochrony w postaci szczepionki przed zakażeniem, szybkie podjęcie leczenia może je uchronić przed zakażeniem WZW B. Należy zabrać dziecko do lekarza lub Oddziału Ratunkowego i zgłosić kontakt z WZW B. Dziecko otrzyma zastrzyk z immunoglobuliny przeciwko WZW B (HBIG) i zacznie cykl szczepień przeciwko wirusowi.
- Z osobą zakażoną WZW B nie należy dzielić szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, igieł, pilników, cążek ani nożyczek do paznokci, myjek ani ręczników.

WZW B nie rozprzestrzenia się przez

- Kichanie lub kaszel
- Całowanie lub przytulanie
- Karmienie piersią
- Żywność lub wodę
- Korzystanie ze wspólnych naczyń lub szklanek
- Przelotny kontakt (jak w pracy)

Posiadanie WZW B nie jest przyczyną do wykluczenia ze żłobka lub przedszkola, szkoły, pracy ani innych aktywności.

Pamiętaj:

Dopilnuj, by dziecko ukończyło cały cykl szczepień przeciwko WZW B w przewidzianym czasie, aby zapewnić mu ochronę.



Jak mogę uzyskać więcej informacji?

Przydatne informacje na temat WZW B można uzyskać z następujących źródeł:

- Od lekarza rodzinnego
- W miejscowym wydziale ds. zdrowia publicznego HSE

Inne informacje i ulotki na temat WZW B można znaleźć na następujących stronach:

- www.hpsc.ie
- www.cdc.gov/hepatitis/hbv
- www.who.int
- www.immunisation.ie



Data: April 2017
Opracowanie: Grupa robocza ds. WZW Grupy ds. chorób zakaźnych medycyny zdrowia publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego i Ośrodek Nadzoru Ochrony Zdrowia, Dyrektor ds. Stuzby Zdrowia.

Zapalenie wątroby typu B (WZW B)

Ty i Twoje dziecko



Jeżeli cierpisz na WZW B i jesteś w ciąży, planujesz ciążę, niedawno urodziłaś lub już masz dzieci, w tej ulotce znajdziesz informacje o sposobach ochrony niemowlęcia i starszych dzieci.

Szczepienia zapewniają skuteczną ochronę przed zakażeniem WZW B u niemowląt i dzieci.

Czym jest zapalenie wątroby typu B?

WZW B to wirus oddziałujący na wątrobę, zdolny wywołać poważną chorobę. Rozprzestrzenia się przez kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi zakażonej osoby. Niektóre osoby zakażone WZW B nigdy nie pozbywają się wirusa i mogą pozostać nosicielami do końca życia. Jest to przewlekła postać WZW B i osoby na nią cierpiące mogą zakażać innych. U niektórych osób z przewlekłym WZW B rozwija się poważna choroba wątroby.

U niektórych zaś nie występują żadne objawy i takie osoby mogą nieświadomie przekazywać wirusa innym.

A co, jeżeli jestem w ciąży?

Kobiety ciężarne powinny poddać się testom na obecność WZW B. Przy dodatnim wyniku testu lekarz ginekolog lub rodzinny może skierować Cię do specjalisty.

Jakie jest ryzyko dla mojego dziecka?

Wirusa WZW B możesz przekazać dziecku podczas porodu lub wkrótce po nim, jeżeli dziecko nie otrzyma szczepionki.

Dzieci zakażone WZW B we wczesnych latach są bardziej narażone na infekcję przewlekłą. U nawet 90% dzieci zakażonych przy porodzie, które nie otrzymają szczepionki, rozwija się przewlekła postać choroby. Często prowadzi to do problemów zdrowotnych na późniejszych etapach życia.

Jak mogę chronić swoje dziecko?

Najlepszym sposobem ochrony noworodka przed WZW B jest immunizacja. Immunizacja obejmuje szczepionkę przeciwko WZW B oraz immunoglobulinę przeciwko temu wirusowi (HBIG).

- Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko WZW B i immunoglobuliny przeciwko WZW B (HBIG) noworodek powinien otrzymać tuż po porodzie.
- Dopilnuj, aby niemowlę dostało kolejną dawkę szczepionki – zwykle w wieku dwóch, czterech i sześciu miesięcy – w ramach programu szczepień dla dzieci.
- Lekarz rodzinny lub pediatra zleci badanie krwi po upływie dwóch miesięcy od zakończenia cyklu szczepień, by sprawdzić, czy dziecko jest zakażone. Jeżeli nie doszło do zakażenia niemowlęcia, badanie krwi pozwoli ustalić, czy dziecko posiada ochronę dzięki szczepieniu.
- Ponad 95% niemowląt, które otrzymają pełny cykl szczepień przeciwko WZW B oraz immunoglobulinę przeciwko temu wirusowi, posiada ochronę przed WZW B.

Dopilnuj, by dziecko ukończyło cały cykl szczepień przeciwko WZW B w odpowiednim czasie, aby zapewnić mu ochronę.

Czy szczepionka przeciwko WZW B jest bezpieczna?

- Szczepionka przeciwko WZW B jest bezpieczna i skuteczna.
- Wśród skutków ubocznych może wystąpić bolesność i zaczerwienienie w miejscu wkłucia.

- Szczepionkę przeciwko WZW B można podawać wraz z innymi obowiązkowymi szczepionkami.
- Szczepionka przeciwko WZW B nie jest produktem krwiopochodnym.
- Przez szczepionkę nie można się zarazić WZW B.

Czym jest immunoglobulina przeciwko WZW B?

- Immunoglobulina przeciwko WZW B (HBIG) może zapewnić wczesną ochronę osobom narażonym na duże ryzyko zakażenia, jak noworodki zakażonych matek.
- Jest to produkt krwiopochodny. Dawcy krwi podlegają badaniom przesiewowym. Krew jest badana i poddawana obróbce, by zmniejszyć ryzyko zakażenia.
- Nie koliduje z innymi szczepionkami podawanymi w okresie niemowlęcym.

Cięcie cesarskie nie chroni noworodka przed WZW B.

Karmienie piersią jest bezpieczne dla dziecka. WZW B nie przenosi się z mlekiem matki.

Jak mogę chronić pozostałe dzieci?

Dzieci mieszkające z osobami cierpiącymi na przewlekłe WZW B mogą się zarazić. WZW B może przenieść się z zakażonego dziecka lub osoby dorosłej na inne dzieci, jeżeli nie zostały one zaszczepione. Szczepienie pozwoli chronić dzieci przed zakażeniem. Jeżeli Ty sam/a lub inny członek rodziny macie WZW B, zabierz dzieci do lekarza rodzinnego na szczepienie.

- Szczepionka przeciwko WZW B jest bezpieczna i skuteczna, a także zapewnia najlepszą ochronę