

Antes de tomar o Oseltamivir (Tamiflu), preciso fornecer alguma outra informação ao meu médico?

Antes de tomar este medicamento, avise ao seu médico se qualquer das condições abaixo se aplicarem a você:

- Se estiver tomando qualquer outro medicamento, incluindo os que podem ser comprados sem receita médica. O Oseltamivir pode ser tomado juntamente com paracetamol, ibuprofeno ou ácido acetilsalicílico (Aspirina)
- Se você tiver alergia a qualquer tipo de drogas
- Se você apresentar qualquer problema nos rins
- Se estiver grávida ou amamentando.

Esses medicamentos antivirais protegem contra a contração da doença. É muito importante que você continue tomando os comprimidos até o fim do ciclo, mesmo que já esteja se sentindo bem.



25-27 Middle Gardiner Street Dublin 1 Ireland
Tel: +353 1 876 5300 Fax: +353 1 856 1299
Email: info@hpsc.ie www.hpsc.ie
Last reviewed: March 2017

OSELTAMIVIR (TAMIFLU)

para prevenção da Influenza aviária ("gripe aviária")



O que é o OSELTAMIVIR (TAMIFLU)?

O antibiótico prescrito chama-se Oseltamivir (*Tamiflu*). Ele é apresentado na forma de comprimidos. É um medicamento antiviral muito conhecido, utilizado para prevenir ou tratar a influenza ("a gripe"). Esse medicamento tem sido utilizado com sucesso em vários países há muitos anos.

Por que este medicamento me foi recomendado?

Você provavelmente esteve em contato próximo com aves suspeitas de estarem infectadas com o vírus da influenza aviária ("gripe do frango"). Por isso, existe um pequeno risco de que você possa ter sido infectado com esse vírus. As pessoas infectadas com o vírus da influenza aviária ("gripe do frango") podem ficar gravemente doentes.

Qual o benefício da administração deste medicamento?

O risco de infecção através do vírus da influenza aviária ("gripe do frango") é muito pequeno. Porém, se você tomar o Oseltamivir (*Tamiflu*) poderá evitar que o vírus se propague dentro de seu corpo. Se você for infectado pelo vírus, este medicamento antiviral poderá prevenir que você fique doente ou reduzir a gravidade da doença resultante da infecção.

Qual o risco da administração deste medicamento?

A maioria das pessoas que toma o Oseltamivir (*Tamiflu*) não encontra nenhum problema. Porém, como a maioria dos medicamentos, o Oseltamivir (*Tamiflu*) pode causar efeitos colaterais. Náusea,

vômito e dores estomacais são as queixas mais freqüentes. Esses sintomas são mais comuns após a primeira dose e normalmente melhoram com o tempo. Diarréia, bronquite, vertigem, cansaço, dores de cabeça e dificuldades para dormir são efeitos colaterais menos comuns. Os efeitos colaterais são como os sintomas da influenza ("a gripe"). É muito importante procurar o seu médico, caso você apresente algum desses sintomas enquanto estiver tomando o Oseltamivir (*Tamiflu*).

O Oseltamivir (TAMIFLU) elimina a possibilidade de contração da doença?

Se você estiver correndo o risco de ser infectado pelo vírus da influenza aviária ("gripe do frango"), a administração de medicamento antiviral poderá reduzir a probabilidade de contração da doença. Porém, esse medicamento não eliminará totalmente essa possibilidade e, por isso, você deve ficar alerta e procurar seu médico caso sinta alguma indisposição.

Como devo administrar o medicamento antiviral?

Você receberá um comprimido a ser tomado por dia durante o período de contato com as aves infectadas, e um comprimido a ser tomado por dia por mais 7 dias após o contato. É importante que você siga corretamente as instruções de administração dos comprimidos.

- Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, com um copo de água cheio
- Não quebre ou mastigue os comprimidos
- Recomendamos tomar o comprimido pela manhã, junto com seu café da manhã
- Caso esqueça de tomar um comprimido, tome assim que lembrar. Não tome uma dose dupla.