

- Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в том числе с персистирующим гепатитом С.
- Невакцинированные и иммунологически скомпрометированные пациенты, такие как реципиенты трансплантатов или лица получающие иммуномодуляторы.
- Новорожденным ВИЧ-инфицированным и детям, контактировавшим с ВИЧ-инфекцией, необходимо ввести вакцину против гепатита В при рождении, а затем согласно регулярной схеме вакцинации детей.

f) Люди с другими рисками

- Лица, часто меняющие сексуальных партнеров, мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ), мужчины и женщины – коммерческие секс-работники, люди, занимающиеся анальным сексом, лица, посещающие клиники, в которых занимаются лечением инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и лица с диагнозом ИППП.
- Заключенные учреждений закрытого типа.
- Тату-художники и лица, занимающиеся пирсингом.
- Иммигранты из районов с высокой или средней распространенностью ВГВ.
- Бездомные.
- Дети, рожденные от родителей из стран с высокой или средней эндемичностью.
- Туристы, путешествующие в районы с высокой или средней распространенностью ВГВ.

Вакцина

- Вакцина против гепатита В является безопасной, эффективной вакциной и отличной способом защитить себя.
- Обычно курс вакцинации состоит из трех инъекций - во время первого посещения клиники, через один месяц и через шесть месяцев после первой инъекции.
- В некоторых случаях, после введения трех инъекций сдают анализ крови для проверки того, защищены ли Вы.
- Некоторым людям может быть необходимо ввести дополнительную(ые) дозу(ы) вакцины. Очень небольшое число людей не реагирует на вакцинацию, и они не могут быть защищены.
- Среди побочных эффектов могут быть болезненность и покраснение в месте введения инъекции.
- Если Вы беременны или хотите забеременеть, обсудите это со своим врачом перед вакцинацией.
- Вы не можете заразиться гепатитом В при вакцинации.

Резюме

- Гепатит В является серьезным заболеванием, но его можно предотвратить.
- Он распространяется при контакте с кровью или биологическими жидкостями инфицированного человека.
- Вакцинация и надлежащая гигиена могут защитить Вас от гепатита В.



Где я могу получить больше информации?

Больше информации о гепатите В можно получить из нижеприведенных источников:

- От своего семейного врача
- В своем отделе медицины труда
- Местного департамента здравоохранения HSE (управления службы здравоохранения)

Дополнительную информацию и буклеты о гепатите В можно получить на следующих веб-сайтах:

- www.hpsc.ie
- www.cdc.gov/hepatitis/hbv
- www.who.int
- www.immunisation.ie
- www.emitoolkit.ie



Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Health Service Executive



Дата: April 2017

Авторы: Рабочая группа по гепатиту группы инфекционных заболеваний общественного здравоохранения, департаменты общественного здравоохранения и центр наблюдения за охраной здоровья, управление службы здравоохранения.

Гепатит В Вакцина

Что Вы должны знать



Что такое гепатит В?

Гепатит В – это вирус, поражающий печень, и очень тяжелое заболевание.

Некоторые люди, больные гепатитом В, не могут избавиться от вируса и остаются инфицированными на протяжении всей жизни. Это хронический гепатит В, а люди, у которых он есть, называются «носителями».

У некоторых носителей развиваются тяжелые заболевания печени. У некоторых носителей могут отсутствовать симптомы заболевания, и они могут не знать о том, что инфицированы, и могут распространять вирус? даже не догадываясь об этом.

Что такое хронический гепатит В?

Некоторые люди не могут избавиться от вируса. Они остаются инфицированными на протяжении всей жизни и являются разносчиками гепатита В. Это хронический гепатит В, и люди с этой формой заболевания могут инфицировать других.

Они могут чувствовать себя здоровыми на протяжении всей жизни и у них могут отсутствовать какие-либо симптомы поражения печени. У некоторых людей развиваются более тяжелые заболевания печени, такие как рубцевание печени (цирроз), печеночная недостаточность или рак. Если у Вас есть гепатит В, то Вы все еще можете заболеть гепатитом другого типа, например А или С.

Как он распространяется?

Гепатит В распространяется при контакте с кровью или биологическими жидкостями инфицированного человека. Вы можете заразиться гепатитом В, если Вы:

- Занимались сексом с человеком, носителем гепатита В.
- Пользовались одними иглами или другими приспособлениями при употреблении инъекционных наркотиков.
- Использовали нестерильные иглы для пирсинга, нанесения татуировок, акупунктуры, электролиза, или если Вам вводили инъекцию использованной иглой.
- Совместно пользовались станками для бритья, зубными щетками, мочалками, полотенцами, книперсами или другими предметами, на которых может быть кровь или другие биологические жидкости.
- Контактывали с кровотокащими ранами или порезами инфицированного человека.
- Являетесь медицинским работником или человеком, контактирующим с инфицированной кровью или биологическими жидкостями.

- Являетесь ребенком человека, носителя гепатита В. В некоторых случаях, не удается определить точный источник инфицирования.

Вы не можете заразиться гепатитом В через

- Чихание или кашель
- Поцелуи или объятия
- Кормление грудью
- Еду или воду
- Совместное пользование тарелками или стаканами
- Безопасный контакт (например, на работе)

Нахожусь ли я в зоне риска?

Следующие категории людей находятся в зоне повышенного риска инфицирования ВГВ, и должны пройти вакцинацию от гепатита В, если они еще не сделали этого:

а) Лица с профессиональным риском контактирования с кровью или средами, загрязненными кровью

- Врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, лабораторный персонал, технические работники морга, персонал скорой помощи, уборщики, грузчики, студенты медицинского, медсестринского и стоматологического факультетов, другие медицинские работники.
- Персонал и воспитатели в центрах для лиц с нарушениями обучаемости (в том числе детских дошкольных учреждениях, специальных школах и других центрах).
- Персонал тюрем, регулярно контактирующий с заключенными.
- Персонал служб безопасности и аварийных служб
 - Сотрудники служб безопасности и спасательных служб
 - Сотрудники An Garda Síochána
 - Сотрудники пожарной службы
 - Военные
 - Сотрудники охранных компаний.
- Любые другие работники, контактирующие с кровью в результате травмирования.

б) Семейные и бытовые контакты

- Новорожденные дети, рожденные от матерей с острым или хроническим ВГВ (также см. Постконтактную профилактику ниже).
- Супруги, сексуальные партнеры, семейные и бытовые контакты лиц с острой и хронической инфекцией. В случаях, если анализ на наличие маркеров текущей или перенесенной инфекции является клиническим показанием, это должно быть сделано одновременно

с введением первой дозы. Вакцинацию не следует откладывать в ожидании результатов анализа. Дополнительные дозы могут не потребоваться у лиц с явным свидетельством контактирования в прошлом.

с) Усыновление, удочерение/устройство детей на воспитание в приемные семьи

- Рекомендуется проводить вакцинацию семей, усыновивших детей из стран с высокой или средней распространенностью ВГВ. Эти дети должны быть проверены на наличие ВГВ или перенесенный вирусный гепатит В.
- Всем краткосрочным патронатным воспитателям и их семьям, у которых в срочном порядке размещают детей, должна быть предложена вакцинация против гепатита В. Постоянным патронатным воспитателям и их семьям, которые принимают детей с высоким риском инфицирования ВГВ, также должна быть предложена вакцинация.

Примечание: Также может быть необходима вакцинация от гепатита А.

д) Потребители инъекционных наркотиков (ПИН/IDU) и их контакты

- Все потребители инъекционных наркотиков.
- Бытовые контакты, дети и сексуальные партнеры потребителей инъекционных наркотиков.
- Лица, подверженные риску перехода на потребление инъекционных наркотиков (в том числе и те, кто на данный момент курят героин и/или крэк, или потребители амфетамина с тяжелой зависимостью).

е) Лица с высоким риском из-за медицинских состояний:

- Лица, которым регулярно переливают кровь или препараты крови, и персонал, ответственный за введение таких препаратов.
- Лица с нарушениями обучаемости, которые посещают детские сады, специальные школы и другие учреждения.
- Пациенты с хронической почечной недостаточностью. Пациентам с хронической почечной недостаточностью рекомендуется вводить вакцину против гепатита В, разработанную специально для таких пациентов (Fendrix или HBVAXPRO40). Иммуный ответ на вакцину против гепатита В может быть уменьшен по сравнению с иммунокомпетентными лицами и может наблюдаться более быстрое снижение анти-НВ антител.