



احمي طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي RSV



يمكنك الآن حماية طفلك
من الإصابة بالفيروس
المخلوي التنفسي.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي،
ولماذا ينبغي عليّ حماية طفلي من
الإصابة به؟

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس شائع الانتشار،
يُسبب عدوى في الجهاز التنفسي لدى الأطفال الصغار.
تكون الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال
دون سن الثلاثة أشهر أشدّ مقارنةً بالأطفال الأكبر سنًا.

في كل شتاء في أيرلندا، يصاب طفل من كل طفلين
بالفيروس المخلوي التنفسي، ويحتاج كثير من الأطفال

إلى الرعاية الطبية من قبل الممارس العام، أو قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال. ويتم إدخال أربعة من كل مائة طفل إلى
المستشفى بسبب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، مع احتياج بعض الأطفال إلى علاج خاص في وحدات العناية
المركزة.

نيرسيفيماب Nirsevimab هو أفضل وسيلة لحماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

بالمستشفى وإصابته بالمضاعفات الأخرى الناتجة عن عدوى الفيروس المخلي التنفسي.

يعمل عقار نيرسيفيماب على الفور، لذا يتم حماية طفلك عند مغادرته المستشفى ودخوله البيئات التي يمكن أن ينتشر فيها الفيروس المخلي التنفسي، مثل المنزل أو المجتمع.

سوف يحمي نيرسيفيماب طفلك من الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي على الأقل لمدة خمسة أشهر طوال فترة الشتاء، عندما تكون معدلات الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي في ذروتها.

في أيرلندا، توصي بعقار نيرسيفيماب كل من وزارة الصحة، والمكتب التنفيذي للخدمات الصحية HSE، واللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين NIAC. كما يُوصى أيضًا بالتحصين بعقار نيرسيفيماب في دول أخرى في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.

هل نيرسيفيماب آمن بالنسبة لطفلي؟

أثبتت التجارب السريرية المفصلة، والدراسات العلمية الكبرى، والخبرات المستفادة من برامج التحصين الأخرى بعقار نيرسيفيماب، المُطَبَّعة في أوروبا، أنه آمن وفعال.

كما أن نيرسيفيماب تم ترخيصه من الهيئة الأوروبية للأدوية EMA عام 2022.

ما هي الآثار الجانبية للعقار؟

الآثار الجانبية ليست شائعة. ويتم الإبلاغ عن آثار جانبية طفيفة وثانوية لدى أقل من 1% من الأطفال الذين يتلقون عقار نيرسيفيماب. وتشمل هذه الآثار الجانبية:

- احمرارًا في الجلد، وتحديدًا في موضع الحقن لدى الطفل،
- ارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة،
- طفحًا جلديًا خفيفًا.

نادرًا ما يتم الإبلاغ عن تفاعلات تحسسية أو فرط الحساسية. كما أنه سوف يتم مراقبة طفلك عن كثب بعد إعطائه الحقنة. لا يحتوي التحصين بعقار نيرسيفيماب على

كيف يمكنني حماية طفلي من الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي؟

يُوصى بتحصين طفلك بعقار يُطَلَق عليه اسم „نيرسيفيماب“. فسوف يعمل هذا على حماية طفلك من عدوى الفيروس المخلي التنفسي طوال شهور الشتاء. يأتي عقار نيرسيفيماب في شكل حقنة واحدة، يتم إعطاؤها في عضلة فخذ الطفل.

وهو مجاني. سوف يُعرض عليك تحصين طفلك قبل العودة من مستشفى الولادة إلى منزلك.

يمكن حجز موعد لتحصين الأطفال الأكبر سنًا، الذين تنطبق عليهم الشروط، على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للخدمات الصحية HSE.

ما هو نيرسيفيماب، وكيف يعمل؟

نيرسيفيماب هو جسم مضاد يمكنه حماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي. وهو يختلف عن اللقاح الذي يحفز جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة. بدلًا من ذلك، يوفر نيرسيفيماب الأجسام المضادة مباشرةً لحماية طفلك. ولا يتداخل نيرسيفيماب مع لقاحات أو أدوية الأطفال الأخرى، ويمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع الحقن الأخرى

ما هي فوائد حماية طفلي من الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي؟

عقار نيرسيفيماب فعال جدًا، ويحمي من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المخلي التنفسي بنسبة أعلى من 80%. كما أنه أيضًا يقلل من خطر احتياج طفلك إلى العلاج

أين يمكنني معرفة المزيد؟

سوف يتحدث أخصائي الرعاية الصحية، الذي تتعاملين معه، إليك حول التحصين بعقار نيرسيفيماب، وسوف يجيب أي أسئلة ربما تكون لديك. إذا قررت حماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، فسوف يُطلب منك إعطاء موافقة شفهية على حصول طفلك على الحقنة.



للاطلاع على مزيد من المعلومات لدى المكتب التنفيذي للخدمات الصحية HSE، زوري موقع:

www.hse.ie/RSV



للاطلاع على نشرة معلومات المريض لدى الوكالة الأوروبية للأدوية، زوري موقع:

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/beyfortus

الفيروس المخلوي التنفسي، ولا يمكن أن يسبب المرض المرتبط بالفيروس المخلوي التنفسي.

سيجيب أخصائي الرعاية الصحية، الذي تتعاملين معه، على أي استفسارات لديك.

ما هي البدائل؟

إذا اخترت عدم إعطاء طفلك عقار نيرسيفيماب، فلن يتم حمايته من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

وسوف يستمر الفيروس المخلوي التنفسي في الانتشار بين الأطفال والكبار، وربما يلتقطه طفلك ويمرض.

إذا اخترت عدم تحصين طفلك ضد الفيروس المخلوي التنفسي، ربما تحتاجين إلى التقليل من خطر إصابة طفلك بالفيروس المخلوي التنفسي من خلال:

- تنظيف يديك جيدًا
- تجنب الأماكن المزدحمة
- الحد من مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تشبه البرد، أو عدوى أخرى.

إذا غيرت رأيك وأردت حماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، اتصلي بمستشفى الولادة الذي وُلد فيه طفلك.

من الذين ينبغي عدم إعطائهم نيرسيفيماب؟

يمكن لأخصائي الرعاية الصحية، الذي تتعاملين معه، أن يقدم لك المشورة إذا رأى أن طفلك لا ينبغي أن يتلقى عقار نيرسيفيماب. يجب أن يكون طفلك في حالة جيدة عند إعطائه نيرسيفيماب. إذا كان طفلك تحت المراقبة بسبب أي حالة مرضية مثل مشاكل الدم، أو عدوى، أو صعوبات التنفس، أو انخفاض السكر في الدم، عندئذ ربما يتم تأجيل إعطاء نيرسيفيماب لحين تحسّن حالة طفلك.