



احمي طفلك من الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي RSV



يمكنك الآن حماية طفلك حديث
الولادة من الإصابة بالفيروس
المخلي التنفسي.

ما هو الفيروس المخلي التنفسي،
ولماذا ينبغي عليّ حماية طفلي من
الإصابة به؟

الفيروس المخلي التنفسي هو فيروس شائع الانتشار،
يسبب أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال الصغار.
يكون الأطفال دون سن الثلاثة شهور أكثر عرضة
للإصابة بالفيروس المخلي التنفسي مقارنة بالأطفال
الأكبر سناً.

في كل شتاء في أيرلندا، يتم إدخال أربعة من كل

100 طفل حديث الولادة إلى المستشفى بسبب الإصابة بالفيروس المخلي

التنفسي، مع احتياج بعض الأطفال إلى علاج خاص في وحدات العناية المركزة. كما أنه من المتوقع أن يصاب طفل من كل
طفلين حديثي الولادة في أيرلندا بالفيروس المخلي التنفسي في فصل الشتاء، وأن يحتاج عدد كبير منهم إلى الرعاية الطبية
من قبل الممارس العام، أو قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال.

نيرسيفيماب Nirsevimab هو أفضل وسيلة لحماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلي التنفسي.

كيف يمكنني حماية طفلي من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟

يُوصى بتحصين جميع الأطفال، الذين يولدون في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ إلى فبراير ٢٠٢٥، بعقار يُطلق عليه اسم «نيرسيفيماب». فسوف يعمل هذا على حماية طفلك من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي طوال شهور الشتاء.

يأتي عقار نيرسيفيماب في شكل حقنة واحدة، يتم إعطاؤها في عضلة فخذ الطفل. وهو مجاني. سوف يُعرض عليك تحصين طفلك قبل العودة من مستشفى الولادة إلى منزلك.

ما هو نيرسيفيماب، وكيف يعمل؟

نيرسيفيماب هو جسم مضاد يمكنه حماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي. وهو يختلف عن اللقاح الذي يحفز جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة. بدلاً من ذلك، يوفر نيرسيفيماب الأجسام المضادة مباشرة لحماية طفلك. ولا يتداخل نيرسيفيماب مع لقاحات أو أدوية الأطفال الأخرى، ويمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع الحقن الأخرى

ما هي فوائد حماية طفلي من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟

عقار نيرسيفيماب فعال جداً، ويحمي من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي بنسبة أعلى من ٠.٨٪. كما أنه أيضاً يقلل من خطر احتياج طفلك إلى العلاج في المستشفى وإصابته بالمضاعفات الأخرى الناتجة عن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي.

يعمل عقار نيرسيفيماب على الفور، لذا يتم حماية طفلك عند مغادرته المستشفى ودخوله البيئات التي يمكن أن ينتشر فيها الفيروس المخلوي التنفسي، مثل المنزل أو المجتمع.

سوف يحمي نيرسيفيماب طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي على الأقل لمدة خمسة شهور طوال فترة الشتاء، عندما تكون معدلات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي في ذروتها.

في أيرلندا، توصي بعقار نيرسيفيماب كل من وزارة الصحة، والمكتب التنفيذي للخدمات الصحية **HSE**، واللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين **NIAC**. كما يُوصى أيضاً بالتحصين بعقار نيرسيفيماب في دول أخرى في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.

هل نيرسيفيماب آمن بالنسبة لطفلي؟

أثبتت التجارب السريرية المفصلة، والدراسات العلمية الكبرى، والخبرات المستفادة من برامج التحصين الأخرى بعقار نيرسيفيماب، المُطبَّقة في أوروبا، أنه آمن وفعال. كما أن نيرسيفيماب تم ترخيصه من الهيئة الأوروبية للأدوية **EMA** عام ٢٠٢٢.

ما هي الآثار الجانبية للعقار؟

الآثار الجانبية ليست شائعة. ويتم الإبلاغ عن آثار جانبية طفيفة وثانوية لدى أقل من ١٪ من الأطفال الذين يتلقون عقار نيرسيفيماب. وتشمل هذه الآثار الجانبية:

- احمراراً في الجلد، وتحديدًا في موضع الحقن لدى الطفل،
- ارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة،
- طفحاً جلدياً خفيفاً.

نادراً ما يتم الإبلاغ عن تفاعلات تحسسية أو فرط الحساسية. كما أنه سوف يتم مراقبة طفلك عن كثب بعد إعطائه الحقنة.

لا يحتوي التحصين بعقار نيرسيفيماب على الفيروس المخلوي التنفسي، ولا يمكن أن يسبب المرض المرتبط بالفيروس المخلوي التنفسي.

أين يمكنني معرفة المزيد؟

سوف يتحدث فريق القابلات أو الطبيب، الذي تتعاملين معه، إليك حول التحصين بعقار نيرسيفيماب، وسوف يجيبون أي أسئلة ربما تكون لديك. إذا قررت حماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، فسوف يُطلب منك إعطاء موافقة شفهية على حصول طفلك على الحقنة.



لمزيد من المعلومات من المكتب التنفيذي للخدمات الصحية HSE، زوري موقع www.hse.ie/RSV



للاطلاع على نشرة معلومات المريض لدى الوكالة الأوروبية للأدوية، زوري موقع:

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/beyfortus

سوف يجيب الطبيب أو القابلة، التي تتعاملين معها، على أي استفسارات لديك.

ما هي البدائل؟

إذا اخترت عدم إعطاء طفلك عقار نيرسيفيماب، فلن يتم حمايته من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

وسوف يستمر الفيروس المخلوي التنفسي في الانتشار بين الأطفال والكبار، وربما يلتقطه طفلك ويمرض.

إذا اخترت عدم تحصين طفلك ضد الفيروس المخلوي التنفسي، ربما تحتاجين إلى التقليل من خطر إصابة طفلك بالفيروس المخلوي التنفسي من خلال:

- تنظيف يديك جيداً
- تجنّب الأماكن المزدحمة
- الحد من مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تشبه البرد، أو أمراض أخرى.

إذا غيرت رأيك وأردت حماية طفلك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، اتصلي بمستشفى الولادة الذي وُلد فيه طفلك.

من الذين ينبغي عدم إعطائهم نيرسيفيماب؟

يمكن لفريق القابلات أو الطبيب المعالج، الذي تتعاملين معه، تقديم المشورة إذا كانوا يرون أنه ينبغي عدم إعطاء طفلك نيرسيفيماب. يجب أن يكون طفلك في حالة جيدة عند إعطائه نيرسيفيماب. إذا كان طفلك تحت المراقبة بسبب أي حالة مرضية مثل مشاكل الدم، أو عدوى، أو صعوبات التنفس، أو انخفاض السكر في الدم، عندئذ ربما يتم تأجيل إعطاء نيرسيفيماب لحين تحسّن حالة طفلك.