

ПОМНИТЕ О ДИФТЕРИИ

Знаете ли вы, что дифтерию можно предотвратить путем вакцинации? Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или медсестрой относительно вакцинации и уточните, рекомендуется ли вам и членам вашей семьи принимать эту вакцину.

Дифтерия может поражать горло, нос или кожу.

Симптомы зависят от того, какая часть тела затронута инфекцией и был ли человек ранее вакцинирован.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ:

- Горло: боль в горле, потеря аппетита, небольшое повышение температуры, отек шеи, затруднение дыхания.
- Нос: выделения из носа, поверхностные язвы или ранки.
- Кожа: ранки и поверхностные язвы.



Помните, что при подозрении на дифтерию необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и лечения.

Дифтерия диагностируется с помощью мазка для выявления бактерий, а ее лечение предполагает прием антибиотиков. Кроме того, если анализы подтвердят заражение дифтерией, больному может быть назначена антитоксическая сыворотка.

Медицинский работник:

- Возьмет у вас анализы для диагностики
- В случае получения положительного результата сообщит об этом в учреждение здравоохранения



С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте <http://www.hpsc.ie/A-Z/VaccinePreventable/Diphtheria/>

Версия 1.0