

ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ДИФТЕРІЮ

Чи знаєте ви, що дифтерії можна запобігти шляхом вакцинації?
Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або медсестрою
щодо вакцинації та уточніть, чи рекомендується вам та членам
вашої сім'ї приймати цю вакцину.

Дифтерія може вражати горло, ніс або шкіру.

Симптоми залежать від того, яка частина тіла уражена
інфекцією і чи була людина раніше вакцинована.

НАЙПОШИРЕНІШІ СИМПТОМИ:

- Горло: біль у горлі, втрата апетиту, невелике підвищення температури, набряк шиї, утруднення дихання.
- Ніс: виділення з носа, поверхневі виразки або ранки.
- Шкіра: ранки та поверхневі виразки.

Пам'ятайте, що у разі підозри на дифтерію необхідно
звернутися до лікаря для проведення діагностики та лікування.

Дифтерія діагностується за допомогою мазка для виявлення
бактерій, а її лікування передбачає прийом антибіотиків.
Крім того, якщо аналізи підтвердять зараження дифтерією,
хворому може бути призначена антитоксична сироватка.

Медичний працівник:

- Візьме у вас аналізи для діагностики
- У разі отримання позитивного результату проінформує про це заклад охорони здоров'я



Додаткову інформацію можна отримати на вебсайті
<http://www.hpsc.ie/A-Z/VaccinePreventable/Diphtheria/>

Версія 1.0