

SMAOINIGH AR DHIFTÉIRE

An raibh a fhios agat gur féidir diftéire a chosc ach vacsaíniú a fháil? Labhair le do dhochtúir nó le d'altra faoin vacsaín agus an moltar duit féin agus do do theaghlach í.

Is féidir le diftéire cur isteach ar do scornach, do shrón nó do chraiceann.

Braitheann na siomptóim ar an gcuid den chorp atá buailte agus ar an vacsaín a bheith faighte ag duine.

IS IAD NA SIOMPTÓIM IS COITIANTA NÁ:

- Scornach: scornach tinn, easpa goile, agus fiabhras beag, at muiníl, deacracht anáilaithe
- Srón: sileadh ón tsrón agus othrasú dromchlach nó cneácha
- Craiceann: cneácha agus othrais éadoimhne



Cuimhnigh, má tá seans ann go bhfuil an diftéire i gceist, ní mór duit cóir leighis a lorg le haghaidh measúnaithe agus cóireála.

Áirítear le measúnú diftéire amhrasta maipíneacht a ghlacadh chun tástáil do na baictéir agus áirítear antaibheathaigh sa chóireáil; má dheimhnítear diftéire d'fhéadfadh go mbeadh gá le frith-thocsain.

Déanfaidh an gairmí cúram sláinte:

- Samplaí le haghaidh diagnóise a bhailiú
- Cásanna a chur in iúl don tSláinte Phoiblí



Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:

<http://www.hpsc.ie/A-Z/VaccinePreventable/Diphtheria/>

Leagan 1.0