

Informații despre pojar

Pojarul afectează copii și adulți deopotrivă

Pojarul este o afecțiune gravă, foarte ușor de contactat

Poate cauza orbirea sau chiar decesul

Simptomele unei persoane cu pojar sunt:

- **Febră mare**
- **Tuse**
- **Rinoree**
- **Ochi roșii**
- **O erupție cutanată roșie care începe din zona capului și se răspândește în jos pe tot corpul**

Pojarul poate cauza pneumonie, diaree, atacuri de apoplexie, infecții ale urechii, edeme și leziuni cerebrale

Iritație specifică pojarului acoperind corpul:



Pojarul este mai acut la bebeluși, adulți, femei însărcinate și persoane cu probleme de sănătate.

Pojarul în Irlanda

Numărul de persoane afectate de pojar din Irlanda a scăzut în ultimii ani. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea copiilor și adolescenților li se administrează trivaccinului ROR.

Cu toate acestea, epidemiile de pojar continuă să apară în rândul populației de etnie rromă. În 2016, în Irlanda s-a înregistrat o epidemie de amploare ce a afectat mulți copii de etnie rromă care nu fuseseră vaccinați.

Cum îmi pot proteja familia de pojar?

Vă puteți proteja copiii împotriva pojarului administrându-le **trivaccinul ROR**. Acesta reprezintă cea mai bună și mai sigură metodă de a vă proteja copilul.

Se recomandă administrarea trivaccinului ROR copiilor la 12 luni de viață și din nou la vârsta de 4-5 ani (în cadrul școlii).



Copilul dumneavoastră va fi protejat de pojar dacă i s-au administrat 2 doze de trivaccin ROR.

Cum procedez în cazul în care nu sunt sigur(ă) dacă copilului meu i s-a administrat trivaccinul ROR?

În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă copilului i s-a administrat trivaccinul ROR, vă rugăm să-i solicitați medicului dumneavoastră de familie administrarea acestuia pentru a vă proteja copilul. O doză suplimentară nu va vătăma copilul chiar dacă acestuia i s-a mai administrat una în prealabil.

În Irlanda, vaccinul este administrat în mod **gratuit** fiecărui copil sau adolescent care are nevoie de acesta. Nu trebuie să plătiți pentru ca acesta să beneficieze de vaccin.

Cum procedez în cazul în care cred că un membru al familiei mele are pojar?

Rămâneți în casă și TELEFONAȚI-VĂ medicul

Spuneți-i medicului sau asistentei că suspectați că o persoană ar avea pojar și urmați-le sfatul

Nu mai primiți vizite la domiciliu până când nu se însănătoșesc toate persoanele afectate. Membrii familiei trebuie să rămână la domiciliu, în special dacă majoritatea acestora nu sunt vaccinați. Astfel veți preveni răspândirea infecției

Cum procedez în cazul în care membrii familiei mele au avut contact cu o persoană cu pojar?

- În cazul în care un copil SAU o persoană cu vârsta de sub 30 de ani nu a fost vaccinat(ă), acestora trebuie să li se administreze trivaccinul ROR în termen de 3 zile pentru a preveni pojarul
- Bebelușilor între 6 și 12 luni trebuie să li se administreze anticipat o doză de trivaccin ROR
- În cazul în care un bebeluș sau un copil mic a primit deja trivaccinul ROR, este posibil să necesite o a doua doză în mod anticipat
- De regulă, bebelușii mai mici de 5 luni sunt protejați de mame dacă acestea au avut pojar sau dacă li s-a administrat trivaccinul ROR
- Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau asistentei pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de pojar și trivaccinul ROR
- Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați www.immunisation.ie și www.hpsc.ie

Rețineți:

1. Dacă nu vă simțiți bine, rămâneți în casă și telefonați-vă medicul de familie
2. Mergeți la medicul de familie, administrarea trivaccinului ROR este **GRATUITĂ pentru copii**
3. Dacă un copil/adolescent/adult trebuie să fie consultat de un medic și nu dispune de un card de sănătate, vă rugăm să sunați la biroul local HSE pentru incluziune socială:



Mulțumiri

Această broșură a fost adaptată pe baza „Measles-information leaflet for the Traveller community” – Traveller Health Unit, Cork and Kerry and Departments of Public Health HSE East and Midlands



Pojar



Ce este pojarul?

Cum să vă protejați familia

